

**DE  
HAEMORRHOIDIB  
US DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
QUAM AD...**

---

Pompeo Marangoni



de  
**HAEMORRHOIDIBUS**  
DISSERTATIO INAUGURALIS  
QUI  
**AD MEDICINAE LAUREAM**  
CONSTITUTAE  
IN CATHEDRA PUBLICA  
**UNIVERSITATIS PATAVINAE**  
PROMITTIT  
**MARANGONI POMPEJUS**



PATAVIAE  
TYPIS PERADA  
MDCCCXCVI



5

6

7

## DE HÆMORRHOIDIBUS.



**S**icuti alia organa humani corporis, etiam intestina rectum et artus, et vasa proprie dicta habet et possidet. Arteries, quæ ad intestinum rectum distribuuntur a superioribus quibusdam truncis suppediuntur, vel ab arteria mesocolica sinistra, ab hypogastrica, et a pudenda communis. Illæ, quæ rectum decussat a mesocolica sinistra, vocantur hæmorrhoidales internæ, alias etiam quæ egressæ sunt per anteriorem sui partem, hæmorrhoidales externæ dicuntur. Ut patet ab anatomie artibus illæ omnes ad internam hæmorrhoidalem per anastomosis minorem, et tali ratione efformantur, ut quo sanguis impellitur in vasa. Venæ autem prope arterias invicuntur et commixtæ sunt, ut accipi in universum, vel sunt rectæ et mesocolicæ, et latioræ. Venustulæ Venæ ex his, quæ ad sui sanguinem habentur in mesocolicam sinistra decussat sanguinem, qui cum illa Stru et mesenteria communis ferat ad hepatis, et in hoc claustrum illis locum habent. Hæc venæ lacerat ventura præditæ, atque plerumque adipsa prope vasa circumdantur, frequenter compressæ erudunt vel cum inciduntur, vel quæ-

do facies die morientis in intestino recto ab eis  
afficiantur. Ob hanc remota res est singularis  
in hâcâ comperto distinctio, in tumorem velien  
tum ligatur, quæ magnitudinis emergunt. Tu-  
mores istiusmodi non infrequenter dolent, et em-  
pionem profundant, qui anguis tum in quantita-  
te, quam in qualitate potest differre, non non  
semper e venâ systemate promunt sed hæc ali-  
quando ortus ducti ab arterioso systemate em-  
eo, vel rupta in sola arteriisibus.

Hæc adnotandum est relictæ ad hæmorrhoides,  
quod apud rectores sub nomine hæmorrhoidum,  
non intelligitur unus morbus, sed multiplex, et  
nunc habetur pro intumescencia hærææ vasorum,  
et nunc pro erossione angulæ. Illæ inter  
hæmorrhoides et hæmorrhoides non sunt ratio-  
ne distinctionem fecerunt illi, qui nomine sty-  
mologiam recipiunt. Profluviæ angulæ ex  
istâ res nunc nunc est, quæ e profluviæ na-  
turæ erossione, tumorem emittit, et tunc pe-  
riculo plenum. Non nunc ista tubercula sunt  
paria, immo quædam et mole, et figura, et sede,  
et natura diversa erodunt. Hæc distinctio orta  
est in hæmorrhoides cancer, vel *flavies*, in in-  
terna et externa, in benigna et maligna et  
sic porro. Cancer vocatur illæ quæ diuque an-  
gula erossione erodunt, et tantummodo mole-  
stas et cruciatibus segetibus laborat: *flavies*  
dicuntur illæ, quæ sanguinem aliquando expositi  
interna, quæ turgent in intestino supra col-  
ophincterem: externa cæcæ, quæ ad eam mar-

glans exteriori apparet. Eae enim, pro diversa, quae referunt, rursus figure, diversa etiam insignuntur nominibus: hinc *condar* nonnulli appellant illas, quae foras protuberantius retendunt vicinas sibi intus iunctas, rursus vel intus, reversante quando exhibent tubercula verrucis densitas, reversante quando rotundas liquida distantia referant et de pennis vana *pia*, *folia*, *auris* *ovellae*, *juglandis*, *pruni*, vel etiam vel *colubinae* rotundae et formam edocent; modo partes luteas, modo totas vel partem occupant; tunc atra vel nigrescent propendunt; tunc circum ipsam volent, et tunc sub rima ex una protuberant et agnitione faciem dantorem. Sangui qui a vasis haemorrhoidalis fluit, non semper est equalis; et modo fluidus, modo viscus et modo densus apparet. Ille fluxus pro diversa natura quae refert, appellatur vel *benignus*, vel *malignus*, *mitis*, vel *gravis*, et tunc *crithus* et tunc *symptomatus*. Statu autem hoc conditione pathologica, fluxus haemorrhoidalis in nonnullis casibus periodicus occurrere solet, et modo a locali vicio, modo ab universali systematis affectione solutus, et tunc ab adueto, tunc ab infirmate vitulata rursus artum ducit. Tandem haemorrhoides distinguuntur in primarias, et secundarias, modo in simplices et conjunctas proli vel cum aliis morbis conjunctas aut vel non. Fluxus sanguinis a vasis haemorrhoidalis aliquando solet conjugare repente et aliqui morbus, sed quodque caliditatem huius pro-

cedere novella symptomata morbosae affectionis instantia, et ex illa novella localia, et novella universalia. Ad haec ultimi symptomata, videlicet universalia, pertinent: dolor capitis, spirandi difficultas maxime post prandium, pediculus, cardialgiae, sudor post quolibet corporis motum paulo vehementiores, anorexia, dyspnoea, urticae oris, infusus abdominalis, ructus, horborypsi, stress abstricta et alia haemorrhoidi. Haec quoque referuntur novellae universaliter aberrantes sicuti anxietas, oppressio, constrictio in variis visceribus abdominalis, in lumbis, in coxis et sic porro. Non raro talibus affectionibus febri associatur, quae plus minus universae circumstantiae novellae functiones perturbat et laedit, unde incommoda etiam ingruuntur non parva. Istis symptomatibus morbus haemorrhoidum aliisque non infrequenter stipatur. Fluxus sanguinis non semper tantum parvus, aliquando efficitur cum febris, et aliquando contingit emunctio mense serena, vel maculae cui novelli deducuntur vocant haemorrhoidum effluvia, sed impropria.

Symptomata quoque haec constantia, non semper eadem sunt et differunt, prout haemorrhoides vel cunctae sunt, vel jam fluxus. Sed haec diversa conditione etiam diversi effectus contingunt. Haemorrhoides cunctae stipantur plerumque torminibus, doloribus cretibus, aut praesidentibus et consequentibus ipsis haemorrhoidum inter spleniticos cum cunctis cruditatibus et aliis haemorrhoidum

modi. Non raro ab strangulationem igneum tumorem intestini recti inflammatione corripiscitur, et hic habens ruitus inflammationis ipsius vel abscessum, gangrenam etc. Aliquando heu incommode parit, et via, aut ut via quidem debent, et hoc observatur in illis casibus, in quibus tumores hemorrhoidales molles et fluctuantes sunt.

Relata ad hemorrhoides fluxiles eadem dicenda sunt, et fluxus singulis vario modo et aspectu se præbet; hic efficitur tunc plenus jectis, tunc effusus tunc est arterialis, et tunc venosus, et cujus diversa qualitas et quantitas, etiam diversi effectus oriuntur. Hemorrhoides, quæ evadunt in fluxiles, producant cupere incommode se illa enumerata, et apparent intense menstruum periodo. Porroque hoc obstatum hoc obijciunt partiali sub capite maxime viciis non infrequenter compositis, et interdum sanguinem magis in capite effundunt cum maximo periculo hominis. Tamen hoc fluxus singulis a variis hemorrhoidilibus non semper eadem signis, aliquando ita bene effectus esse, et in consensibile casibus videre est. Et ceteris hemorrhoidibus comparantibus, multi mortis legati fuerunt, utpote suppurata, gravissima incommode supervenient, et ipsæ apoplexiæ, et ceteris aliis commota. Quæ quævis ita sit, haud tamen absterrendum est sententias illorum, qui hemorrhoidales fluxus necessarios et aptum ad laenorem morbos pervertendo appellat; neque minus eorum opinio



est facienda, qui periret, est saluti ab hæmorrhoidibus sibi non expectari posse crediderunt: proptereaque necquævis esse adjuvandum, est dicendum. Ad fluxum intestinalem neque laudari prostrationem, neque vitæperari posse existimo; juxta enim vel necesse pro humilis ætate, temperamento, vitiis generis, morbis ac symptomatibus, quæ vel fluxum præcedunt, vel comitantur.

Inter causas quæ generare valent hæmorrhoides, cœcæ sunt quæque plerum, et illæ quæ impellunt sanguinem ad arterias hæmorrhoidales, et illæ quæ interceptam repræsentant ejusdem per viam est remedium. Ad hæc pertinet dyscrasia calentes et frigidæ, cœca corpore supra, et acuta, diuturna, elastica, livida, parva laboriosa, æquilatio, morbi vicinarum partium acuti uti, vesicae, vesicae suppressæ emunctio, quæ contingere solent in aliis locis, virus blennorrhœicum, affectio rheumatica, arthritica et similia. Etiam periret vitæ modus remanet, et quæque nuclei cœcæ, cœcæ intestinalis, hæc in cœcis intestinalis distensio manens, dæmna, compressio: alius obstructa, compressio a flatibus indurata: obstructio hepatis, hepatis, tumor uteri, vesicae et alia hujusmodi.

Ad hæc affectionem pro alia dispositi sunt constitutio, qui deperit hanc indolent, qui vitiis peragunt hanc et obusam, qui pathemalibus solent et curis diuturnis laborant, et qui illucitibus habitibus obusam edunt. Dispositio ad hæmorrhoides non semper acquisita est, non

neque magis inguicis recurrit a parotidibus in proles transibit, uti a varicella adactatum fuit. Sic morbus invenitur magis familiaris aetati virili ac praeventiori, laud tamen ceteris parit, nec desunt, ut refert Livetand, infantes septem aut octo annorum, qui hoc fluxu ad ultimum aetatem laetam laboraverant.

Uti dictum fuit, fluxus haemorrhoidalis et male et bene conducere potuit; nec desunt scriptores praestantissimi, qui tentantur graves et molestas affectiones ex hoc fluxu effluente. Inter aliquid haemorrhoides acutas fuisse; sicuti nec desunt illi, qui deducunt haemorrhoides providam aetate naturae molimen, et a pluribus morbis bonum erroris inoculationem et immunitatem, inter quos scriptores recentiores Hippocrates Effluens uterendi fluxus vel salubres, vel nocivi sunt, et juxtaea aut ducuntur non ut repetendum ex totoque a quantitate sanguinis fluxus, ut aliam a conditione corporis, a morbi laetate, a tempore et ab aliis peculiaribus circumstantiis. Si haemorrhagia aliqua supprimitur, salus suspicanda est ab alia, quae vires alterius evacuationis gerat. Hinc si in latu nullus haemorrhoides non morchant, facillime potest evenire aliqua metastasis, et hinc vel haemorrhagiae, vel graves congestiones, aut inflammationes viscerum, non solum in venter, sed etiam pectoris et capitis, nec non aliae paroxysmae agilitatis tam acutae, tam chronicae et tandem apoplexia vel mora. Etenim certis temporibus fuit haemorrhoides aliam in hominibus

plethorica, vel in illis, in quibus indicata est re-  
tine rectis, vel quando hæmoptysi, et hæmste-  
mesi, atque hæmaturis superveniunt, sed opor-  
tet ut fluxus non excedat. De hac re potestatis-  
do etiam Hippocrates in suis scriptis dicit: «*non-  
haudulicis et asphriticis bonum; quæ apoplecti-  
cis, insensibilibus si veritas aut hæmorrhoides  
apparuerint, insensu tollitur.*» Ex quibus verbis  
patet hanc veritatem esse hæmorrhoidalem fluxum,  
si in illis morbis contingat in quibus a sanguinis  
evacuatione non generali, tunc præsertim locali,  
lenitatem est expectandam: atque aliter sen-  
tendum, si in illis manifestatur, in quibus sanguinis  
fluxus morbis prævertebendis est expectandum rei-  
dicere præcavendum valere creditur. Cuius in ca-  
sibus, utrum critica, aut symptomatica sit fluxus,  
morbi indicis cui loco fluxus supervenit, et præ-  
sertim hæmura subsequens ab eodem recte ju-  
dicabitur.

Interim sicuti a spontanea hæmorrhoidibus, aut  
ab illa quæ naturæ cunctis et evidentiæ aliquæ  
causis excitatae fuerint, non recte est partien-  
dum, hæc tamen idem dici potest, cum hæ-  
maturis jam sit fluxus, atque repente aut arte,  
aut natura vi, aut præpostere morbis supprimi-  
tur. Tunc hæmorrhagias superveniunt in illis  
locis, vel etiam apoplexia vel coma. Ex quo po-  
tius est quasi interitum medicum in independe-  
ntibus morborum causis schickel, utrum hæmorrhoides  
habitudinis legem jam adaptas regum a longo  
jam tempore manerint, vel non ne.

In curatione haemorrhoidum primam a caudis perpendendam est, utrum hanc fluxum vel alere debeat, vel praevenire, an vero moderari vel compescere. Hic sciendum est, quod quatuor haemorrhoides inter ceteras haemorrhagias nimis terribiles debent, ut ab experientia et observationibus comprobatum est, et censet salutem sequentem ab hac promota negotio meliore conservatum esse atque restitutum, tamen judicandum est hinc fluxum praeter naturam, ut jam dicti Galeanus Hinc et hinc plerumque libere atque alius, et saepe praevenit haemorrhoidalem fluxum, non semper curatio debet consistere in eo, ut depletio illi restitatur, nam idem efficit potest cum diuta, curatioribus, raras sectionibus et ceteris auxiliis hujusmodi. Ex hoc patet quod non solum licet interdum, sed oportet aliquando haemorrhoidalem fluxum impedire et arceri. Sententia illorum, qui judicant hunc fluxum velle esse atque necessarium ne facilius curetur, falsa ex integro est. Tamen confitetur quod aliquando conveniat sequi indicationem hanc naturae, et hunc fluxum provocare, praecipue quando per hanc viam manifeste fit inclinatio naturae ipsius. Utilitas haec haemorrhoides impedendi et arceri in quibusdam casibus, patet ex eo quod natura in multis hunc fluxum non excitat, et multis incommode ex eodem contingant, et saepe ex occasionalibus causis produci potest, ut ab induratis faecibus, equitatione, gravitate et similibus, quin saepe

regula hanc angustia tractato ubi necessaria essent. Notari vero haemorrhoidibus non est necessarium; etenim coniecturas inductas jam non amplius obsequi debemus, incommode potius aceri potest. Ea res cur Hippocrates dixit de diarrhoeis haemorrhoidibus speciebus, non quoniam quatuor eas vel quinque errandam spectant, sed quia tamen secum hanc indicatio et necessitas non est ita generalis ut nunquam sit locus ipsarum curacioni. Etenim vero si casus ex quo haemorrhoidalis fluxus constituitur, ejus generis sit et ipsa quae remedium auxilium, an non praestabit eam potius saltem, ut deinde comparatur fluxus ex quo alia pigneretur haemorrhoida? Hoc preceptum est magis momenti: et ab omnes adhibendum habendum. Verum est quod in casu cum antequam aliquid certi statueretur omnia recte libranda sunt et effectus perpendendi cunctis, qui ex ipso profusio in oeconomia animali permanere possunt ut deinde ab istis recte eruantur, an fluxus secundus vel provocandus sit, an non? Videlicet comparanda est haec affectio morbose cum illis, in quibus haec ex haemorrhoidali fluxu levamen et solutum obtinuit; praeter haec, etiam eadem natura, ac symptomata et sufficiens tractatione apparetur; tandem cognitis causis vel universalis vel localis totidem sunt adiungenda, quae attente explorata plurimum lucem possunt affundere ad distinguendam utram haemorrhoidalem conditionem revera salutare naturae committit sit, an effectus aliquis morbose causae.

Relatio ad hoc De Hæm. ciliis jure meritoque habetur mentionem facta de demitis, quæ prominent tunc ex aliis eversionibus nascentibus, et tunc ex aliis morbis, quæ sibi adhibent hæmorrhoides.

Cursus hæmorrhoidum in se variari debet et præterea eversiones curari, unde hæmorrhoides productæ fuerint et sustineantur. Ob hæc varias methodos erit variæ et medicinas dæmon pro diversis causis, a quibus subsistant, et pro diversis naturis, quæ tenent. Hinc ardeant et purpurescentes pluresque, tunc sectionibus atque diuersis tenuis, et purgantibus, vel coagulatis, vel densatis; ubi densitati occurrunt remedia ex decoctionibus emollientibus, nec non blanda coagulata ut caseus, melleus, palpi tumefacti, cremor tartari et sic porro. Si adeat dolor et tumores ad deponendum faciem inclinantes, tunc adhibentur emollientes injectiones ex oleo, butyro et lacte compositæ, et tali ratione illæ alius doloribus sedantur; nec aliam in his causis spernenda sunt suppositoria ex iisdem substantiis vel similibus parata. Hæc aliquando non sufficiunt, et hæc tunc unius quicquid emollientis est, decubitus orizontalis corporis, et compressiones, si adiant, ardeant; aliquando potius sunt adhibendi et frigida aqua composita, aut ex aceto plumbi in aqua dilata, et hoc præcipue in hæmorrhoidibus inflammatis. Aliæ quoque præparata et plumbi, et stanni, conuulsoria fuerint, ut curata, calidam, sulphur stanni, et oxydum stanni sublimatum.

tum, quae omnia relinquere praestat. Venae sectio in cura haemorrhoidum indicata est, quando et calor et ardor et dolor ingens, pulsus, pulsus manifestant inflammationem cui addenda sunt cataplasmata emollientia ex oleo, melle et c., et his praerita analgesia varie consocianda. Cataplasmata ex lilla hyacinthi, nec non ex lilla coctis lactuca proleptae ad temperanda symptomata et leniendus dolorum frequenter observatum fuit. Haec quoque concedatur suppositum populeum, vel cum butyro recentior mixtura. Haec omnia aliquando non sufficiunt, et tunc ad levem strictectionem in rectum alia intranda sunt et calentes vapores aquae, et hirudines et c., et si ab applicatione hirudinum irritatio membranae obsequatur, tunc ope haeculae operari debent tutius, et sic praepellere graeviores lésiones, et graviores curae. Non raro causa haemorrhoidum est proleptae recti interna, et tunc indicata est repositio illius, quae efficitur vel manu agilia, vel adstringentibus graduatim admodum, vel alio modo simili. Hoc peracto la postera vitanda sunt scilicet omnia illa, quae laeva possint esse relaxationi. Quando haemorrhoides internae gravitas periculosis symptomatibus superius non creverunt nec per applicationem hirudinum, nec per leuaciones ex oleo, butyro, et aliis aliis curantur, nec per alios rationes huius generis, et accipere bene habent later vel splinctorem ita ut suspicio celatur de ipsarum tractata la indurationem, la suppurationem, la abscessum, la fistulam, la per-

graciosa etc., tunc hinc in casibus, radicalis curatio fit per excisionem ipsarum haemorrhoidum, et haec praeferenda est ceteris ligaturis quam nonnulli proponebant. Idem dicendum est de haemorrhoidibus externis quando partem non sunt, atque refractarias ceteris auxiliis.



# THESES DEFENDENDÆ. ---

## I.

*Pulsus frequens non semper designat febrem inflammatoriam.*

## II.

*Mitiorum aliquando judicantur bonar.*

## III.

*Melichias melendi in variis repletiōibz discernendi est temperanda.*

## IV.

*Paritas non semper dependet a contractionē ventriculi, sed aliquando efficitur a contractionē abdominis et diaphragmatis.*

## V.

*Forma Stomatiae aliquando sistit remedium cytophan.*

## VI.

*Pulsatio non est signum pathognomonicum curis aneurysmatis.*

## VII.

*Factis claturnis experimentis comprobatur falsus tantummodo procedendo est.*

---

QC 1350 14

